

MALATTIE INFETTIVE E INFEZIONI NEI BAMBINI

MALATTIA/INFEZIONE	RIAMMISSIONE SCOLASTICA/PRESCOLARE DOPO ASSENZA PER MALATTIA	QUANDO RIVOLGERSI AL MEDICO
MALATTIE INFETTIVE TRASMESSE PER VIA RESPIRATORIA		
RAFFREDDORE	Nessuna restrizione qualora il bambino presenti solamente una lieve secrezione nasale e tosse.	Dopo 3 giorni di febbre oppure qualora la tosse peggiori/il bambino accusi respiro affannoso.
COVID-19	Dopo la guarigione o comunque in base alle indicazioni del medico di medicina generale.	Dopo 3 giorni di febbre oppure in caso di sintomi sospetti *
INFLUENZA	Dopo la guarigione o comunque in base alle indicazioni del medico di medicina generale.	Dopo 3 giorni di febbre oppure in caso di sintomi sospetti *
PERTOSSE	Dopo 5 giorni dall'inizio del trattamento antibiotico oppure, in assenza di trattamento antibiotico, dopo 21 giorni dall'inizio della malattia.	In caso di tosse persistente che supera i 7 giorni.
TUBERCOLOSI	In base alle indicazioni dello pneumologo.	In caso di contatto con un malato. In caso di tosse persistente che supera i 7 giorni.
MALATTIE ESANTEMATICHE (MALATTIE CHE CAUSANO ERUZIONI CUTANEE)		
VARICELLA	In assenza di nuove vescicole, fino a quando tutte le vescicole non saranno secche.	Eruzioni cutanee purulente. Febbre alta per più di 3 giorni. Herpes oftalmico (infezione a livello oculare).

FARINGITE STREPTOCOCCICA, SCARLATTINA	Dopo 48 ore dall'inizio del trattamento antibatterico.	Febbre, mal di gola, linfonodi del collo ingrossati/doloranti.
MALATTIA BOCCA MANI PIEDI	In assenza di nuove vescicole, fino a quando tutte le vescicole non saranno secche.	Disidratazione imminente (a causa della comparsa di ulcere in bocca).
ERUZIONI CUTANEE GENERICHE	Nessuna restrizione.	In caso di eruzione cutanea persistente o in peggioramento.
QUINTA MALATTIA (Erythema infectiosum)	Nessuna restrizione.	
SESTA MALATTIA (Exanthema subitum)	Nessuna restrizione.	
HERPES	Bambini dell'asilo: In base alle indicazioni del medico di medicina generale. Bambini che frequentano la scuola: Nessuna restrizione.	Qualora la vescicola sia ancora "fresca" dopo 7 giorni.
MONONUCLEOSI INFETTIVA	Dopo la febbre.	Dopo 3 giorni di febbre oppure in caso di sintomi sospetti*
MORBILLO	Dopo 4 giorni dalla comparsa dell'eruzione cutanea tipica della malattia.	In caso di contatto con un malato, febbre + infiammazione oculare + eruzioni cutanee.
PAROTITE	Dopo 5 giorni dalla comparsa del gonfiore tipico della malattia.	Gonfiore intorno alle orecchie.
MALATTIE INFETTIVE DELLA PELLE		
MICROSPORIA	Nessuna restrizione qualora le lesioni infiammatorie siano coperte. Si sconsiglia la partecipazione alle ore di educazione fisica e agli sport di squadra ai bambini che presentano lesioni sulle zone scoperte del corpo fino al primo esame micologico negativo.	In caso di comparsa dell'eruzione tipica della malattia.

MOLLUSCO CONTAGIOSO (Molluscum contagiosum)	Nessuna restrizione.	Diffusione dell'eruzione cutanea.
VERRUCHE	Nessuna restrizione.	
SCABBIA	Subito dopo il trattamento riuscito.	Eruzioni cutanee pruriginose.

MALATTIE INFETTIVE INTESTINALI

DIARREA/VOMITO	Dopo 48 ore dall'ultimo episodio di vomito o diarrea. In seguito a una diarrea prolungata: con il certificato medico che escluda la contagiosità del bambino.	Rischio di disidratazione.
PARASSITI INTESTINALI	Nessuna restrizione. È necessaria l'eliminazione.	
EPATITE A	Dopo 14 giorni dalla comparsa dei primi sintomi oppure dopo 7 giorni dalla comparsa dell'ittero.	Comparsa dell'ittero.

ALTRE MALATTIE INFETTIVE E INFEZIONI

IMPETIGINE	Nessuna restrizione qualora l'eruzione cutanea si trovi in una zona coperta. In caso contrario, dopo 48 ore dall'inizio del trattamento antibiotico.	Eruzione cutanea persistente, "fresca" e purulenta.
CONGIUNTIVITE – virale	Bambini dell'asilo: quando la secrezione oculare si attenua. Bambini che frequentano la scuola: nessuna restrizione.	Secrezione oculare per più di 5 giorni.
CONGIUNTIVITE – batterica	Dopo 48 ore dall'inizio del trattamento antibiotico.	Arrossamento del bulbo oculare sempre più marcato.
OTITE	Quando la febbre e il dolore alle orecchie si attenuano.	In assenza di miglioramento dopo 48 ore dall'inizio del trattamento antibiotico.

PIDOCCHI	Nessuna restrizione. È necessaria l'eliminazione.	
----------	---	--

*disidratazione imminente, apatia/irritabilità, febbre alta nonostante i farmaci, respiro affannoso

** episodi frequenti di vomito, diarrea grave, gonfiore e dolore addominale, febbre alta, apatia/irritabilità

ALTRE MALATTIE INFETTIVE E INFEZIONI: RIVOLGERSI AL MEDICO DI MEDICINA GENERALE